



Fecha de recibido: 13-08-2024
 Fecha de aceptado: 05-12-2024
 DOI: 10.22490/21456453.8412

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO: IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Citación: Zuluaga, L., Caballero, A., Arias, J., Lombo, D. y Rivera, M. (2026). Etnobotánica cuantitativa en agropaisajes del Caribe Colombiano: Implicaciones para la conservación del bosque seco tropical - Anexos. *Revista de Investigación Agraria y Ambiental*, 17(1). <https://doi.org/10.22490/21456453.8412>

ANEXOS

Anexo 1. Listado de especies y usos.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS
Rubiaceae	<i>Genipa americana</i> L.	Jagua, palo de jagua, caruto, huito, majagua, encerao, zapatillo, pijiño	CO, LE, PM, EB, AH, FO, AF, SO, CV, PA, PS, ME, OR, AR, RL, SC, UD. 17
Boraginaceae	<i>Cordia alba</i> (Jacq.) Roem. y Schult. Ó <i>Cordia dentata</i> Poiret	Cansaviejo, uvita macho, uvito, jobito	CO, LE, CA, PM, EB, AH, FO, AF, SO, CV, PA, PS, ME, OR, RL UD. 16
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Guacimo, mielquemada	CO, LE, CA, PM, EB, AH, FO, AF, SO, PA, PS, ME AR, RL, UD 15
Fabaceae	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.	Carita, carito, orejero	CO, LE, CA, PM, EB, AH, FO, AF, SO, CV, PA, PS, ME, OR, RL. 15
Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L.	Jobo, hobo, ciruelo, ciruela criolla	CO, LE, CA, PM, AH, FO, AF, SO, PA, PS, ME, OR, AR, RL, SC, UD 14
Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Bonga, ceiba bonga, ceiba bruja	CO, CA, EB, AH, AF, SO, PA, PS, ME, OR, AR, RL, SC, UD. 14

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS
Bignoniaceae	<i>Crescentia cujete</i> L.	Totumo	LE, CA, PM, AH, FO, AF, SO, PA, PS, ME, AR, RL, SC, UD. 14
Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i>	Jaboncillo, pepo, siminuñe	CO, SA, L, PM, L, AH, FO, AF, SO, CV, PA, PS, ME, OR, RL. 13
Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Algarrobo	CO, LE, PM, AH, FO, SO, PA, PS, ME, AR, RL, SC, UD. 13
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	Gusanero, quebracho, santacruz	CO, CA, PM, AH, FO, AF, SO, PA, PS, ME, RL, SC, UD. 13
Malvaceae	<i>Stterculia apetala</i> (Jacq.) H.Karst.	Camajoru, camajorudo, camajon, piñon	CO, LE, CA, PM, EB, AH, FO, AF, PA, PS, ME, OR, UD. 13
Meliaceae	<i>Cedrella odorata</i>	Cedro, cedro cebollo, cedro rojo	CO, LE, CA, PM, EB, AF, SO, CV, PA, PS, ME, RL, UD. 13
Fabaceae	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	Trupillo, cují, trupí	CO, LE, CA, PM, EB, AH, FO, AF, SO, PA, PS, ME, RL. 13
Boraginaceae	<i>Cordia collococca</i>	Muñeco, arato, cauvaro	CO, LE, CA, PM, EB, AH, FO, AF, SO, PA, ME, UD. 12
Rubiaceae	<i>Calycophyllum candidissimum</i> (Vahl) DC.	Guayabo, guayabo macho, guayabo colorado	CO, LE, CA, PM, AH, FO, SO, PA, PS, ME, OR, UD. 12
Fabaceae	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Walp.	Matarraton, madre del cacao	LE, CA, PM, AH, FO, AF, SO, CV, PA, PS, ME, UD. 12
Fabaceae	<i>Cassia grandis</i> L.f.	Cañafistula, cañandonga, acacia rosada, jamanare	CO, LE, PM, EB, AH, FO, SO, PA, ME, OR, RL, UD. 12
Fabaceae	<i>Inga densiflora</i>	Guamo mico	LE, CA, PM, AH, AF, SO, PA, PS, ME, AR, RL, UD. 12
Lecythidaceae	<i>Lecythis minor</i> Jacq.	Cocuelo, olla de mono	CO, CA, PM, AH, FO, AF, PA, PS, ME, AR, SC, UD. 12
Fabaceae	<i>Albizia saman</i> (Jacq.) Merr.	Campano, algarrobillo	CO, LE, CA, PM, EB, FO, AF, SO, PA, PS, OR, UD. 12

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Moraceae	<i>Brosimum alicastrum</i>	Guaimaro, palanco	CO, LE, PM, AH, FO, AF, SO, PA, PS, ME, OR, RL.	12
Muntingiaceae	<i>Muntingia calabura L.</i>	Guayuyo, vara de paloma, niguito, chitato, nigua, PeriquitoCrys	LE, CA, PM, AH, FO, AF, SO, PA, PS, ME, RL, UD.	12
CAnabaceae	<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	Surumbo, zurumbo, majaguillo	CO, LE, CA, PM, AH, FO, AF, SO, PA, PS, ME.	11
Simaroubaceae	<i>Simarouba amara</i>	Aceituno	CO, LE, EB, AH, FO, AF, SO, PS, ME, SC, UD.	11
Fabaceae	<i>Acacia glomerosa</i>	Chicho, baranó	LE, CA, EB, AH, FO, AF, SO, PS, ME, RL, UD.	11
Fabaceae	<i>Acacia macracantha Willd.</i>	Aromo	CO, CA, PM, AH, FO, AF, SO, PA, PS, ME, UD.	11
Moraceae	<i>Maclura tinctoria (L.) D. Don e1 Steud. Ó Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. e1 Benth</i>	Mora, dinde, amarillo	CO, LE, CA, PM, EB, AF, SO, PS, ME, OR, UD.	11
Arecaceae	<i>Sabal mauritiformis (H. Karst.) Griseb. y H. Wendl.</i>	Palma amarga, amarga, chingale, anchambe, enchamba	CO, PM, AH, FO, AF, PS, ME, OR, AR, SC, UD.	11
Polygonaceae	<i>Triplaris americana L.</i>	Varasanta, volador blanco	CO, LE, CA, PM, EB, AF, CV, PA, PS, ME, UD.	11
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum caimito</i>	Caimito, maduraverde	CO, PM, EB, AH, AF, SO, PA, PS, ME, RL, UD.	11
Fabaceae	<i>Vachelia farnesiana (L.) Willd.</i>	Aromo (arbolito, arbusto)	CO, LE, CA, PM, FO, SO, PA, PS, ME, RL, UD.	11
Euphorbiaceae	<i>Hura crepitans L.</i>	Ceiba blanca, ceiba de leche, tronador	LE, PM, EB, AF, ME,AR,RL, SC,UD	10
Fabaceae	<i>Dialium guianense Willd y Steud.</i>	Chicharron	CO, LE, CA, EB,AH, FO, SO, CV, ME, UD.	10

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS
Meliaceae	<i>Carapa guianensis Aubl.</i>	Mazabalo, andiroba, Tangaré, Ébano brasileño, Carapa, Cedro güino	CO, LE, CA, EB, AF, SO, PA, ME, OR, RL. 10
Lythraceae	<i>Lafoensia puniceifolia DC.</i>	Pelincú, guayacan, granadillo	CO, PM, EB, AF, SO, CV, PA, PS, OR, RL. 10
Anacardiaceae	<i>Anacardium excelsum Skeels.</i>	Caracoli, espavé, mijao	CO, LE, EB, AH, AF, PA, PS, ME RL, DO. 10
Fabaceae	<i>Pseudalbizzia niopoides (Abeto ex Benth.) EJM Koenen & Duno</i>	Guacamayo, bayeto, bayo	CO, LE, CA, PM, EB, FO, AF, SO, PS, UD. 10
Fabaceae	<i>Myroxylon balsamum (L.) Harms</i>	Balsamo, balsamo de olor	CO, CA, PM, SO, PA, PS, ME, AR, RL, UD. 10
Fabaceae	<i>Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.</i>	Tirico, chiraco, gallinero, payandé	LE, CA, PM, EB, AH, FO, AF, SO, RL, US. 10
Fabaceae	<i>Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms</i>	Iguá, naumo, tabaca, igua amarillo	CO, LE, PM, EB, FO, SO, PA, PS, OR, RL. 10
Boraginaceae	<i>Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken</i>	Canalete, canalete blanco, canalete prieto, moho, nogal cafetero.	CO, LE, CA, PM, EB, AF, SO, ME, OR, UD. 10
Sapotaceae	<i>Manilkara zapota (L.) P. Royen</i>	Nispero, chicle	CO, LE, PM, AH, AF, SO, PA, PS, ME, RL. 10
Bignoniaceae	<i>Tabebuia rosea (Bertol.) DC.</i>	Roble, roble rosado	CO, LE, CA, PM, EB, SO, PA, PS, ME, OR. 10
Acanthaceae	<i>Bravaisia integrerrima (Spreng.) Standl.</i>	Palo de agua, zancoaraño	CO, CA, PM, FO, PA, PS, ME, OR, UD. 9
Cactaceae	<i>Leuenbergeria guamacho (FAC Weber) Lodé</i>	Guamacho, mokochira	CO, CA, AH, FO, AF, PA, ME, RL, UD. 9
Lauraceae	<i>Nectandra cuspidata Nees & Mart.</i>	Laurel, laurel amarillo	CO, LE, CA, PM, EB, AH, AF, ME, AR. 9
Fabaceae	<i>Erythrina fusca Lour.</i>	Cantagallo	LE, AH, FO, AF, SO, CV, PA, ME, OR. 9

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS
Fabaceae	<i>Haemato Xylum brasiletto</i>	Brasil	CO, LE, PM, FO, AF, ME, RL, SC, UD. 9
Fabaceae	<i>Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand</i>	Trebol, corazon fino, korrozon	CO, LE, CA, PM, FO, SO, PA, SC, UD. 9
Malvaceae	<i>Pachira aquatica Aubl.</i>	Cacao de monte	CO, PM, EB, AH, FO, AF, SO, PA, PS. 9
Moraceae	<i>Ficus tonduzii Standl.</i>	Higueron, caucho, higuerón grande, higuerón pequeño, higueroncillo, lechero, matapalo	CO, PM, EB, AH, FO, AF, SO, PA, PS. 9
Capparaceae	<i>Morisonia odoratissima (Jacq.) Christenh. & Byng</i>	Olivo hembra	CO, CA, AF, SO, CV, PA, ME, OR, SC. 9
Salicaceae	<i>Casearia sylvestris Sw.</i>	Ondequera, dondequera, elemento,	CO, LE, CA, AF, CV, PA, PS, ME, OR. 9
Arecaceae	<i>Attalea butyracea (Mutis ex Lf) Wess.Boer</i>	Palma de vino, corua	CO, AH, FO, AF, PA, PS, AR, SC, UD. 9
Anacardiaceae	<i>Spondias purpurea L.</i>	Ciruela	CA, EB, AH, FO, AF, ME, RL, SC, UD. 9
Anacardiaceae	<i>Spondias radlkoferi Donn. Sm.</i>	Hobo macho	CO, LE, CA, PM, EB, AH, FO, AF, ME. 9
Fabaceae	<i>Centrolobium paraense Tul.</i>	Colorado, amarillo, ba-laustre	CO, CA, PM, EB, SO, PS, AR, UD. 8
Olaceae	<i>Ximenia americana L.</i>	Huevo de morrocoyo, caimito de monte, ciruelo, espino de brujo, limoncillo de playa, limoncillo, limoncito, limoracho	LE, CA, PM, EB, AH, AF, AR, RL. 8
Burseraceae	<i>Bursera simaruba (L.) Sarg.</i>	Indio en cueros, resbala-mono.	CO, LE, FO, AF, CV, ME, RL, UD. 8
Capparaceae	<i>Morisonia indica (L.) ined.</i>	Carne de venado, caimitillo, olivo macho	CO, LE, PM, EB, AF, PS, ME, OR. 8

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS
Fabaceae	<i>Senna atomaria</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Cuchillito, palo zorrillo, frijolillo	LE, CA, PM, FO, PS, ME, OR, SC. 8
Fabaceae	<i>Pterocarpus acapulcensis</i> Rose	Sangregao, paca vieja, sangre mono	CO, LE, CA, EB, AF, PS, ME, OR. 8
Fabaceae	<i>Cassia leiandra</i> Benth.	Coralito, cañafistol llanero, carao amarillo, coralillo	LE, PM, EB, AF, SO, PS, ME, OR. 8
Areaceae	<i>Bactris guineensis</i> (L.) H.E.Moore	Corozo de lata, lata, corozo, uvita de lata	LE, PM, EB, AF, SO, PS, ME, OR. 8
Boraginaceae	<i>Cordia gerascanthus</i> L.	Canalete, canalete de humo, solera, vara de humo, moho, nogal, moncoro	CO, PM, EB, SO, CV, ME, OR, UD. 8
Fabaceae	<i>Pithecellobium lanceolatum</i> (Humb. y Bonpl. ex Willd.) Benth.	Carne fresca, tiribuchi, pintamono, buche, espino	CO, LE, CA, PM, AF, PA, RL, UD. 8
Fabaceae	<i>Zygia inaequalis</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier	Guamo arroyero, carbonero, guamo macho	LE, CA, PM, AF, SO, PS, ME, UD. 8
Capparaceae	<i>Crateva palmeri</i> Rose	Naranjuelo, toco blanco, naranjito	CO, CA, FO, AF, PA, PS, ME, UD. 8
Fabaceae	<i>Libidibia coriaria</i> (Jacq.) Schltl.	Dividivi, chicharron, dividivi negro	CO, CA, PM, FO, AF, ME, RL, UD. 8
Polygonaceae	<i>Coccoloba caracasana</i> Meisn.	Uvera uvita, palo bolero, martin moreno, uvita roja	LE, PM, AH, FO, AF, SO, PA, OR. 8
Fabaceae	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.	Sangregao blanco, corcho, juana mestiza	CO, LE, CA, PM, FO, SO, PA, ME. 8
Bignoniaceae	<i>Handroanthus billbergii</i> (Bureau & K.Schum.) S.O.Grose	Polvillo, coralibe, lumbré	CO, CA, PM, EB, FO, OR, SC, UD. 8
Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i> L.	Marañón criollo, cajuil	PM, EB, AH, AF, ME, AR, UD. 7
Bixaceae	<i>Cochlospermum vitifolium</i> (Willd.) Spreng.	Papayote, papayuelo, majaguillo	LE, FO, AF, ME, 1, SC, UD. 7

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Lauraceae	<i>Nectandra hihua</i> (Ruiz & Pav.) Rohwer	Laurel	CO, LE CA, PM, SO, PA, PS.	7
Lauraceae	<i>Nectandra membranaceae</i>	Aguacatillo aguacate, ira, quizarrá	CO, EB, AF, CV, PA, PS, ME.	7
Lauraceae	<i>Nectandra mollis</i> (Kunth) Nees	Laurel	CO, LE CA, PM, SO, PA, PS.	7
Fabaceae	<i>Lecythis tuiyana</i> Pittier	Olleto	CO, LE, CA, AH, PS, OR, UD.	7
Fabaceae	<i>Ormosia colombiana</i> Rudd.	Chocho, peronilo	CO, LE, PM, SO, CV, PS, AR.	7
Fabaceae	<i>Swartzia simplex</i> (Sw.) Spreng.	Arará, corocito	CO, PM, AH, AF, PS, OR, UD.	7
Malvaceae	<i>Pseudobombax septenatum</i> (Jacq.) Dugand	Majagua, majagua colora	EB, AF, PA, ME, OR, AR, UD.	7
Sapindaceae	<i>Allophylus triphyllus</i> Merr.	Crispeta	LE, CA, PM, EB, AF, PS, ME.	7
Sapindaceae	<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq.	Mamon, mamoncillo, mamon criollo	CO, CA, AH, FO, AF, ME, OR.	7
Sapotaceae	<i>Pouteria durlandii</i> (Standl.) Baehni	Nispero, nispero de monte, caimitillo, sapotillo	CO, CA, AH, AF, SO, PS, UD.	7
Malvaceae	<i>Apeiba glabra</i> Aubl.	Peine mono, corcho, erizo	CO, LE, EB, PS, ME, OR, UD.	7
Malvaceae	<i>Luehea candida</i> (Moc. & Sesse ex DC.) Mart.	Algodoncillo	CO, LE PM, EB, PA, PS, UD.	7
Polygonaceae	<i>Ruprechtia ramiflora</i> (Jacq.) CAMEy.	Volador, cargamuchacho	CO, LE CA, EB, FO, AF, PS.	7
Salicaceae	<i>Casearia corymbosa</i> Kunth	Varepiedra, vara de piedra de humo, palo blanco, ondequera	CO, LE, PM, AF, CV, OR, UD.	7
Apocynaceae	<i>Plumeria rubra</i> L.	Azuceno rojo, floron, flor de mayo, frangipan	LE, CA, AH, ME, OR, RL, UD.	7

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Fabaceae	<i>Inga vera subsp. vera Humb. & Bonpl. ex Willd.</i>	Guamo, guamo arroyero	CO, LE, PM, AH, AF, SO, PS.	7
Malvaceae	<i>Bombax ceiba L.</i>	Ceiba roja	CO, LE, EB, SO, CV, ME, AR.	7
Malvaceae	<i>Luehea seemannii Triana & Planch.</i>	Guacimo malagano, malagano, guacimo colorado	CO, LE, PM, SO, PA, PS, UD.	7
urticaceae	<i>Cecropia pachystachya Trécul</i>	Guarumo, yarumo	CO, LE, CA, FO, DV, ME, UD.	7
Arecaceae	<i>Elaeis oleifera (Kunth) Cortés</i>	Palma aceitera, nolí, corozo de manteca, corozita, anolí	AH, FO, AF, PS, ME, SC, UD.	7
Lecythidaceae	<i>Gustavia superba (Kunth) O.Berg</i>	Membrillo, pacó, mortecino	AH, AF, CV, ME, OR, SC, UD.	7
Apocynaceae	<i>Aspidosperma megalocarpon subsp. curranii (Standl.) Marc.-Ferr.</i>	Carreto	CO, LE, CA, PM, EB, ME, UD.	7
Fabaceae	<i>Inga nobilis Willd.</i>	Guamo churimo	CO, LE, PM, EB, AH, OR, UD.	7
Malvaceae	<i>Guazuma tomentosa Kunth</i>	Guacima	PM, EB, AH, FO, CV, ME, UD.	7
Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	Guacharaco, tapacontodo, chirlobirlo, fresno	CO, LE, PM, EB, ME, OR, UD.	7
Sapindaceae	<i>Melicoccus oliviformis Kunth</i>	Mamón cutuplí, mamón de mico, mamón de maria, cotoprí	CA, PM, AH, AF, SO, OR, UD.	7
Zigophyllaceae	<i>Guaiacum officinale L.</i>	Guayacan negro, guayaco, guayacan el tranjero	CO, EB, CV, ME, OR, RL, UD.	7
Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex R. Keith</i>	tamaca, corozo	LE, CA, AH, FO, AF, ME, UD.	7
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.</i>	Carreto, quimula	CO, CA, EB, FO, AF, ME, SC.	7
Bignoniaceae	<i>Handroanthus ochraceus var. aguaraguensis M.A.Zapater & Califano</i>	Polvillo	CO, PM, EB, AF, CV, ME, OR.	7

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii Vahl</i>	Guamo arroyero	CO, PM, EB, CV, PS ME, OR.	7
Poaceae	<i>Guadua angustifolia Kunth</i>	Guadua,	CO, PM, SO, PA, PS, OR, AR.	7
Myrtaceae	<i>Eugenia acapulcensis Steud.</i>	Café macho, escobillo, cotopri	CO, PM, AH, FO, AF, ME, UD.	7
Boraginaceae	<i>Cordia panamensis L. Riley</i>	Muñeco blanco, candelero, cunula, cuzú, guacimo peludo, nogal, quesero	CO, LE, PM, EB, AH, AF,	6
Boraginaceae	<i>Cordia subcordata Lam.</i>	Nomeolvides, san joaquin	EB, AH, AF, ME, OR, UD.	6
Burseraceae	<i>Protium sp.</i>	Canime	CO, EB, AH, SO, PA, PS.	6
Capparaceae	<i>Morisonia frondosa (Jacq.) Christenh. & Byng</i>	Malenterrado, carne de venado	LE, EB, FO, AF, ME, UD.	6
Meliaceae	<i>Swietenia macrophylla King.</i>	Caoba	CO, PM, EB, SO, PA, PS.	6
Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	Guayaba dulce, guayabo macho	LE, PM, AH, FO, AF, ME.	6
Polygonaceae	<i>Coccoloba acuminata Kunth</i>	Maiz tostao, maizcocho	LE, PM, AH, AF, SO, OR.	6
Sapotaceae	<i>Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev.</i>	Nispero silvestre, Nispero, mispero, balata	SO, PM, EB, AH, AF, RL.	6
Sapotaceae	<i>Pouteria sapota (Jacq.) HEMoore & Stearn</i>	Mamey	CO, EB, AH, ME, OR, UD.	6
Verbenaceae	<i>Vitex compresa Turcz.</i>	Aceituno	CO, PM, AH, AF, ME, UD.	6
Verbenaceae	<i>Vitex flavens Kunth</i>	Aceituno	EB, AH, AF, OR, AR, UD.	6
Zigophyllaceae	<i>Plectrocarpa arborea (Jacq.) Christenh. & Byng</i>	Yigui	CO, LE, CA, PM, FO, UD.	6

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS
Apocynaceae	<i>Tabernaemontana grandiflora</i> Jacq.	Cojon de fraile, hueva de berraco, borrachero Turma perro, Gueva Perro	CO, AH, ME, OR, RL, SC. 6
Fabaceae	<i>Erythrina velutina</i> Willd.	Arepito, arepo	LE, PM, EB, SO, PS, ME. 6
Malpighiaceae	<i>Malpighia glabra</i> L.	Cereza de monte, cereza, huesito, acerola	CA, AH, FO, AF, PA, ME. 6
Meliaceae	<i>Trichilia acuminata</i> C.DC.	Negrito, mangle blanco, negro viejo	LE, PM, EB, AH, AF, UD. 6
Bignoniaceae	<i>acaranda caucana</i> Pittier	Chingale, gualanday, caco, flormorado, caballito, caro, cornique, guayacán, palo de boba, piñón de oreja.	CO, PM, EB, PS, ME, OR. 6
Burseraceae	<i>Bursera graveolens</i> (Kunth) Triana y Planch. O	Caraña, palo santo, caspín, tatamaco, trementina bijo	EB, PA, ME, OR, RL, SC. 6
Fabaceae	<i>Parasenegalia visco</i> (Lorentz ex Griseb.) Seigler & Ebinger	Chicho, guacamayo, chicható	CO, CA, PM, PS, ME, OR. 6
Fabaceae	<i>Poeppigia procera</i> (Poepp. ex Spreng.) C.Presl	Flor amarilla, guaje	CO, PM, EB, ME, RL, UD. 6
Arecaceae	<i>Crocus chrysanthus subespecie chrysanthus</i>	Coco	AH, CV, PS, ME, OR, UD. 6
Lecythidaceae	<i>Cariniana pyriformis</i> Miers	Abarco, albarco,	CO, PM, EB, AH, AR, UD. 6
Fabaceae	<i>Coulteria mollis</i> Kunth	Yaguaró, piula	CO, PM, FO, AF, ME, UD. 6
Clusiaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Caucho, árbol de Santa maria	CO, LE, EB, FO, AR, RL. 6
Fabaceae	<i>Albizia</i> sp.	Baranoa	CO, LE, CA, PM, EB, UD. 6
Fabaceae	<i>Calliandra magdalenae</i> (Bertero ex DC.) Benth.	Carbonero, rayado	CA, AF, SO, PA, ME, OR. 6

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Moraceae	<i>Ficus nymphaeifolia</i> mill.	Higueron , cope	LE, EB, AF, PA, PS, ME.	6
Sapindaceae	<i>Dilodendron costaricense</i> (Radlk.) AHGentry y Steyerl.	Mamon de maria, loro, iguano	CO, AH, AF, PA, ME, OR.	6
Fabaceae	<i>Prioria copaifera</i> Griseb.	Cativo	CO, EB, AF, ME, RL, UD.	6
Malvaceae	<i>Pachira quinata</i> W.S. Alverson	Ceiba colora, ceiba roja, tolúa	CO, CA, EB, AF, PA, UD.	6
Fabaceae	<i>Senna atomaria</i> (L.) H.S. Irwin y Barneby	Chivato, caranganito	CP, LE, PM, FO, AF, ME.	6
Bignoniaceae	<i>Handroanthus ochraceus</i> subsp. <i>neochrysanthus</i> (AHGentry)	Nn Polvillo	CO, PM, EB. AF, CV, OR.	6
Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysanthus</i> (Jacq.) S.O.Grose ó <i>Tabebuia chrysantha</i>	Guayacan ,polvillo, cañahuate, cañaguante, guayacan brasileiro	CO, PM, EB, SO, ME, OR.	6
Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysanthus</i> subespecie <i>chrysanthus</i>	Polvillo	CO, PM, EB, AF, CV, OR.	6
Bignoniaceae	<i>Roseodendron chryseum</i> (S.F.Blake) Miranda o <i>Tabebuia chrysea</i> S.F. Blake	Alumbre, cañaguante, puy, roble blanco	CO, PM, EB, SO, ME, UD.	6
Chrysobalanaceae	<i>Moquilea magnifructa</i> Sothers & Prance	Carbonero de orilla, carbonero	CO, LE, CA, PM, AF, UD.	6
Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Jobo macho, fresno, pepesama	CO, PM, EB, AR, RL.	5
Combretaceae	<i>Terminalia oblonga</i> (Ruiz y Pav.) Steud.	Vara de leon	CO, LE, PM, EB, SO.	5
Dilleniaceae	<i>Curatella americana</i> L.	Curata, parica, peralejo macho, carne fiambre,	LE, PM, SO, CV, ME.	5
Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	Ñipiñipi, piñiqui piñiqui,	CO, CA, ME, SC, UD.	5

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Lauraceae	<i>Ocotea aurantiodora</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Laurel	CO, PM, SO, PA, PS.	5
Malvaceae	<i>Cavanillesia platanifolia</i> (Bonpl.) Kunth	Macondo, volandero	EB, AF, PS, ME, UD.	5
Meliaceae	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Zambocedro, cedro macho, cedrillo, mestizo, cananeo, bilibil	CO, AF, PA, PS, OR.	5
Polygonaceae	<i>Coccoloba uvifera</i> L.	Papaturro, uvo de playa, uva de playa, murta	CA, EB, AH, AF, RL.	5
Chrysobalanaceae	<i>Chrysobalanus icaco</i> L.	Icaco, hicaco (arbolito)	LE, PM, AH, AF, ME.	5
Fabaceae	<i>Lonchocarpus velutinus</i> Benth.	Bollo limpio	CO, CA, PM, EB, UD.	5
Apocynaceae	<i>Plumeria alba</i> L.	Floron, azuceno	LE, CA, ME, OR, RL.	5
Fabaceae	<i>Brownea grandiceps</i> Jacq.	Florisanto, palocruz, arizal	PM, SO, ME, OR, UD.	5
Fabaceae	<i>Guilandina bonduc</i> L.	Granadillo	CO, LE, CA, PM, EB.	5
Fabaceae	<i>Erythrina berteroana</i> Urb.	Pionío	PM, AH, FO, CV, ME.	5
Fabaceae	<i>Inga spectabilis</i> (Vahl) Willd.	Guamo	LE, AH, AF, SO, PS.	5
Myrtaceae	<i>Psidium guineense</i> Sud.	Guayaba cimarron	EB, AH, FO, AF, ME.	5
Rhamnaceae	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	Manzanita, guinda guinda, manzanita costeña	AH, FO, AF, SO, CV.	5
Areaceae	<i>Bactris mayor</i> Jacq.	Lata arroyera, corozo de lata	CO, PM, AH, AF, UD.	5
Apocynaceae	<i>Aspidosperma desmanthum</i> Benth. ex Müll.Arg.	caney	CO, EB, PA, PS, ME.	5

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Clusiaceae	<i>Garcinia benthamiana</i> (Planch. & Triana) Pipoly	Madroño, mamey	AH, AF, ME, OR, RL.	5
Polygonaceae	<i>Coccoloba coronata</i> Jacq.	Varepiedra, Juan garrote	CA, PM, AH, AF, UD.	5
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce lloron	LE, PM, SO, PA, PS.	5
Fabaceae	<i>Enterolobium shomburgkii</i>	Orejero, hediondo	CO, EB, FO, AF, PS.	5
Fabaceae	<i>Inga edulis</i> Mart.	Guamo mico	LE, AH, FO, AF, SO.	5
Annonaceae	<i>Xylopia frutescens</i> Sieber ex C. Presl sinonimo de <i>Annona squamosa</i> L.	Malaqueto macho, friso-lillo	LE, PM, CV, ME, UD.	5
Boraginaceae	<i>Cordón bicolor</i> A.DC.	Muñeco , paico	CO, PM, AH, AF, PS.	5
Fabaceae	<i>Diphysa carthagenensis</i> Jacq.	Chicharron, carate	CO, LE, CA, PM, ME.	5
Fabaceae	<i>Vachellia tortuosa</i> (L.) Seigler & Ebinger	Cacho de cabra	LE, CA, AH, FO, UD.	5
Apocynaceae	<i>Tabernaemontana amygdali-folia</i> Jacq.	Cojon de fraile, cojon de gato, frailecillo, huevo de perro, jazmín de monte, lirio macho, cruceta	AH, ME, OR, RL, SC.	5
Burseraceae	<i>Dacryodes colombiana</i> Cuatrec.	Caraño, cariaño	SO, EB, AF, ME, RL.	5
Fabaceae	<i>Machaerium biovulatum</i> Micheli	Siete cueros	CO, PM, PA, PS, UD.	5
Sapotaceae	<i>Pradosia colombiana</i> (Standl.) TDPenn. ex TJ Ayers y Boufford	Mano de tigre, mamon de leche, mamon de puerco	CO, LE, PM, AH, AF.	5

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS
Achariaceae	<i>Mayna grandiflora</i> (H. Karst.) Warb. Ó <i>Dendrostylis grandifolia</i> H. Karst. Sinónimo de <i>Carpotroche grandiflora</i> Spruce ex Eichler	Puercoespín, manzana de venado	CO, LE, AH, AF. 4
Caryocaraceae	<i>Caryocar amygdaliferum</i> Mutis	Almendrillo, cagui, genené, maní, chalmagra, jenene	CO, PM, AH, AF. 4
Fabaceae	<i>Platypodium elegans</i> Vogel.	Lomo de caiman, cajón, carbonero, combito, matarratón el tranjero, canoito	CO, OR, RL, UD. 4
Verbenaceae	<i>Vitex cymosa</i> Bertero ex Spreng.	Aceituno	CA, EB, AF, SC. 4
Vochysiaceae	<i>Vochysia lehmannii</i> Hieron.	Centello, salado, saladillo	CO, PM, EB, CV. 4
Capparaceae	<i>Capparidastrium frondosum</i> (Jacq.) I. Cornejo & H.H. Iltis ó <i>Capparis frondosa</i> Jacq. sinónimo de <i>Morisonia frondosa</i> (Jacq.) Christenh. & Byng	Alcaparro, sincogollo	PM, EB, AF, ME. 4
Malvaceae	<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	Algodoncillo	CO, FO, AF, SO. 4
Hernandiaceae	<i>Gyrocarpus americanus</i> Jacq.	Banco	PM, ME, SC, UD. 4
Fabaceae	<i>Caesalpinia ebano</i> H. Karst. Sinónimo de <i>Libidibia punctata</i> (Willd.) Britton	Ebano	CO, FO, ME, OR. 4
Fabaceae	<i>Machaerium arboreum</i> ((Jacq.) Vogel	Latigo, purgación, rejo, corazon fino	CO, CA, SO, OR. 4
Malvaceae	<i>Matisia cordata</i> Bonpl.	Chupa chupa	CO, EB, AH, AF. 4
Fabaceae	<i>Acacia riparia</i> Bertero ex Spreng. Sinónimo de <i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	Aromo, mulato	SO, PS, ME, OR. 4

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Fabaceae	<i>Machaerium capote Triana ex Dugand</i>	Siete cueros, baro blanco	CO, LE, CA, PM	4
Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus elsiae</i>	Pimenton, pimentillo, garbancito, manzanillo	SO, PA, PS, ME.	4
Fabaceae	<i>Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. Sinonimo de Lachesi dendron viridiflorum (Kunth) PGRibeiro, LPQueiroz & Luckow</i>	Baranoa, chicharron, chicho, bocachico	CO, CA, PM, UD.	4
Bignoniaceae	<i>Handroanthus serratifolius (Vahl) SOGrosa</i>	Guayacan	CO, AF, ME, OR.	4
Picramniaceae	<i>Picramnia latifolia Tul.</i>	Quina simple , quina	CO, LE, ME, UD.	4
Apocynaceae	<i>Tabernaemontana robinsonii (Woodson) AOSimões & MEEndress</i>	Cabo de hacha, cojon de fraile, hueva de toro, cabalonga	ME, OR, RL, SC.	4
Boraginaceae	<i>Cordia lucidula I.M.Johnst.</i>	Arato	CO, PM, AF, UD.	4
Fabaceae	<i>Platymiscium hebestachyum Benth.</i>	Bao, baho	CO, PM, CV, PS.	4
Salicaceae	<i>Mayna grandifolia (H.Karst. & Triana) Warb.</i>	Puerco espin, manzana de venado	CO, PM, EB, AF.	4
Boraginaceae	<i>Cordia cymosa (Donn.Sm.) Standl.</i>	Pacocillo, muñeco, laurel negro	CO, PM, AH.	3
Combretaceae	<i>Terminalia amazonia (JFGmel.) Exell</i>	Vara de Leon	CO, LE, PM.	3
Santalaceae	<i>Acanthosyris glabrata Stauffer</i>	Yaya de sangre	PM, AF, UD.	3
Annonaceae	<i>Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal</i>	Guanábana matimbá, guanacona, gallina gorda, cabezona.	AH, AF, ME.	3
Annonaceae	<i>Annona rufinervis (Triana y Planch.) H. Rainer</i>	Guanábana de monte	AH, AF, ME.	3

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Annonaceae	<i>Annona squamosa</i> Vell. <i>Sinónimo de Annona mucosa</i> <i>Jacq.</i>	Anón	AH, ME, UD.	3
Capparaceae	<i>Morisonia americana</i> L	Níspero de monte, toco	FO, ME, SC.	3
Euphorbiaceae	<i>Acalypha macrostachya</i> <i>Jacq</i> <i>sinónimo de Acalypha</i> <i>macrostachya</i> Jacq.	Rascadera, vara de alcal- de, rompe peinilla, zanca de mula, doña Juana, vara de Juana	FO, PA, ME.	3
Fabaceae	<i>Lonchocarpus punctatus</i> <i>Kunth</i>	Bálsamo amargo	AH, ME, UD.	3
Malpighiaceae	<i>Byrsonima crassifolia</i> Lunan <i>ex Griseb. Sinónimo de</i> <i>Byrsonima cinerea</i> DC.	Peralejo, noro, chaparro	AF, PS, OR.	3
Rubiaceae	<i>Alibertia edulis</i> (Rich.) <i>A.Rich. ex-DC.</i>	Trompito, madroño, zumbo, canilla de venado, tabasco, yaya de cajon, rabiicana	AH, AF, AR.	3
Burseraceae	<i>Bursera tomentosa</i> (Jacq.) <i>Triana & Planch.</i>	Bijo, tatamaco, balsamo de incienso, caraño	ME, AR, RL.	3
Chrysobalana- ceae	<i>Licania arborea</i> Seem.	Garcero	CO, PM, AF.	3
Meliaceae	<i>Trichilia hirta</i> L.	Jobo macho, jobo verde, hobo verde	CO, PM, AF.	3
urticaceae	<i>Cecropia angustifolia</i> Trécul	Guarumo	AF, PA, PS.	3
urticaceae	<i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol.	Guarumo	AF, PA, PS.	3
Arecaceae	<i>Bactris gasipaes</i> Kunth	Macana, manaca, china- mato	CO, AH, UD.	3
Arecaceae	<i>Coccothrinax argentata</i> (Jacq.) LHBailey	Palmicha	CO, OR, UD.	3

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Bixaceae	<i>Bixa orellana L.</i>	Bijo, achiote, acotillo	AH, ME, OR.	3
Fabaceae	<i>Caesalpinia punctata Willd .</i>	Granadillo, quebracho, quebrahacha	CO, SO, OR.	3
Fabaceae	<i>Cloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose</i>	Vivaseca, chicharron	LE, CA, PM.	3
Moraceae	<i>Sorocea sprucei (Baill.) JFMacbr.</i>	Pimpinillo , pempinillo, Guáimaro, Lechero, Mamón de leche, Pimpinillo	PM, AF, UD.	3
Polygonaceae	<i>Coccoloba obtusifolia Jacq.</i>	Corralero, tacaloa	LE, CA, AF.	3
Arecaceae	<i>Astrocaryum malybo H.Karst.</i>	Estera, chingalé, enchamba	AR, SC, UD.	3
Fabaceae	<i>Peltogyne purpurea Pittier</i>	Tananeo, nazareno	CO, PM, EB.	3
Fabaceae	<i>Piptadenia psilostachya (DC.) Benth. Sinónimo Marlimorimia psilostachya (DC.) LPQueiroz & Marc.F.Simon</i>	Rabo de iguana, caviche blanco, palo pelusa, arenillo	CO, PM, EB.	3
Chrysobalanaceae	<i>Licania apetala (E. Mey.) Fritsch. Sinónimo de Leptobalanus apetalus (E.Mey.) Sothers & Prance</i>	Cagui, mezcla	CO, EB, AR.	3
Elaeocarpaceae	<i>Sloanea sp.</i>	Cajon	CO, LE, AR.	3
Lecythidaceae	<i>Eschweilera caudiculata R.Knuth</i>	Guasco colorado, tete	LE, AH, AF.	3
Fabaceae	<i>Uribea tamarindoides Dugand & Romero</i>	Tamarindo, tamarindo de mico, algarrobillo	CO, AH, AF.	3
Moraceae	<i>Helicostylis scabra (JFMacbr.) CC Berg</i>	Chmigua, ojo de culebra, mirikiu	AH. ME, RL.	3

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
 IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Arecaceae	<i>Copernicia tectorum</i> (Kunth) Mart.	Palmiche, palma zará	CO, UD.	2
Bignoniaceae	<i>Amphitecna latifolia</i> (Mill.) A.H.Gentry	Totumo silvestre	AR, SC.	2
Celastraceae	<i>Maytenus longipes</i> Briq. Sinónimo de <i>Maytenus sieberiana</i> Krug & Urb.	Corocito, malenterrado prieto	LE, AF.	2
Ebenaceae	<i>Diospyros inconstans</i> Jacq.	Juan de Dios	CO, AF.	2
Phyllanthaceae	<i>Margaritaria nobilis</i> L.f.	Azulejo	PM, UD.	2
Salicaceae	<i>Casearia aculeata</i> Jacq.	Azulito, vara blanca	EB, ME.	2
Sapindaceae	<i>Matayba scrobiculata</i> Radlk.	Guacharaco, laso, Matillo, Laso prieto	AF, UD.	2
Annonaceae	<i>Annona glabra</i> Forssk. Sinónimo de <i>Annona squamosa</i> L.	Anon de agua, anon de puerco, anon de pantano, Guanábana de pantano	AH, ME.	2
Annonaceae	<i>Fusaea longifolia</i> (Aubl.) Saff.	Anón	AH, AF.	2
Cannabaceae	<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	Manzanito, tabardillo.	AH, AF.	2
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum novogranatense</i> (D.Morris) Hieron.	Coca	ME, SC.	2
Euphorbiaceae	<i>Acalypha diversifolia</i> Rusby sinónimo de <i>Acalypha diversifolia</i> Jacq.	Sangretoro, palito feo, prende prende	LE, AF.	2
Fabaceae	<i>Piscidia carthagenensis</i> Jacq.	Arepito, matapez, barbasco,	CO, UD.	2
Fabaceae	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	Chivato, bicho, brusca	LE, ME.	2

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Meliaceae	<i>Trichilia appendiculata</i> (Triana y Planch.) C. DC.	Mangle blanco, hobito, yaya	PM, SO.	2
Rubiaceae	<i>Faramea occidentalis</i> (L.) A. Rich.	Malibu, comida de danta, huesito, jazmin, marfilito amarillo, palo de cucharo, piedrito	EB, ME.	2
Chrysobalanaceae	<i>Parinari pachyphylla</i> Rusby	Pereguetano, perehuetano, clavellino negro, merrecure, siervito	CO, AH.	2
Fabaceae	<i>Acacia collinsii</i> Saff. Sinónimo de <i>Vachellia collinsii</i> (Saff.) Seigler & Ebinger	Cachito	AF, ME.	2
Fabaceae	<i>Inga hayesii</i> Benth.	Guamito, guamita	AH, AF.	2
Fabaceae	<i>Lonchocarpus sanctaemarthae</i> Pittier. Sinónimo de <i>Muellera sanctaemarthae</i> (Pittier) MJSilva & AMGAzevedo	Mucurutú, mucuruto, mucurrutu, macurutú, jepí	EB, UD.	2
Rutaceae	<i>Zanthoxylum microcarpum</i> Griseb. Sinónimo de <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Tachuelo	SO, ME.	2
Rutaceae	<i>Zanthoxylum setulosum</i> P. Wilson	Tachuelo, aguijon amarillo, barbasco, arbacu,	PM, UD.	2
Rutaceae	<i>Zanthoxylum fagara</i> Sarg.	Colina, correosa, uña de gato, tachuelo	CO, EB.	2
Arecaceae	<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc.	Paja silvestre	CO, OR.	2
Arecaceae	<i>Bactris brongniartii</i> Mart.	Caña negra, chacarra, palma cubarro	AR, UD.	2
Arecaceae	<i>Ceroxylon vogelianum</i> (Engel) H.Wendl.	Gallinazo, palma negra	OR, SC.	2

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Fabaceae	<i>Pithecellobium subglobosum</i> <i>Pittier</i>	Corioto, azabache	PA, PS.	2
Fabaceae	<i>Pseudopiptadenia pittieri</i> (Harms) GP Lewis. Sinonimo de <i>Marlimorimia pittieri</i> (Harms) LPQueiroz & LM- Borges	Chicharron	CO, CA.	2
Salicaceae	<i>Homalium racemosum</i> Jacq.	Vara de piedra, angelino, caramacate, chamizo, iguano	CO, ME.	2
Fabaceae	<i>Senna reticulata</i> (Willd.) HSIrwin & Barneby	Bajagua, majaguito	AF, ME.	2
Malpighiaceae	<i>Malpighia emarginata</i> DC.	Cerezo, cerezo montano	AH, AF.	2
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum euryphyllum</i> T.D.Penn.	Cainito	AH, AF.	2
Fabaceae	<i>Pseudopiptadenia</i> sp.	Baranoa	CO, CA.	2
Boraginaceae	<i>Burreria exsucca</i> Jacq.	Uvito macho, flor blanca, guatacaro	LE, OR.	2
Elaeocarpaceae	<i>Sloanea grandiflora</i> Sm.	Achiotillo, erizo	AH, ME.	2
Fabaceae	<i>Lonchocarpus pictus</i> Pittier. Sinonimo de <i>Deguelia picta</i> (Pittier) RACamargo & AM- GAzevedo	Majagua de gallina	CO, AF.	2
Fabaceae	<i>Machaerium goudoti</i>	Chicho	PM, UD.	2
Meliaceae	<i>Trichilia trifolia</i> L.	Palo fierro, conejo colo- rado	LE, PM.	2
Salicaceae	<i>Lunania parviflora</i> Abeto ex Benth.	Yumbé, hormigo	PA, PS.	2

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Euphorbiaceae	<i>Croton malambo</i> H.Karst.	Malambo	ME.	1
Lauraceae	<i>Cinnamomum triplinerve</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm. Sino-niimo de Aiouea montana (Sw.) R.Rohde	Laurel, amarillo laurel, aguacatillo	CO.	1
Fabaceae	<i>Senna fruticosa</i> (Mill.) HSIrwin & Barneby	Cigarron	LE.	1
Moraceae	<i>Ficus dendrocida</i> Kunth	Matapalo, caucho, suan, abraza palo	AF.	1
Rubiaceae	<i>Chomelia spinosa</i> Jacq.	Cacaito, chocolatillo	ME.	1
Sapindaceae	<i>Talisia oliviformis</i> Radlk. Sinonimo de <i>Melicoccus oliviformis</i> Kunth	Mamon de mico, mamon de maria	AF.	1
Fabaceae	<i>Senna bacillaris</i> (Lf) HSIrwin y Barneby	Cigarron	LE.	1
Salicaceae	<i>Xylosma intermedia</i> (Parece.) Triana & Planch.	Carita de santo	AF.	1
Sapindaceae	<i>Cupania latifolia</i> Kunth	Guacharaco	EB.	1
Burseraceae	<i>Bursera glabra</i> (Jacq.) Triana & Planch	Resbalamono	RL.	1
Malvaceae	<i>Pseudobombax máximo</i> A. Robyns	Ceiba bonga, bonga	UD.	1
Rutaceae	<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	Mapurito	SO.	1
Ulmaceae	<i>Ampelocera macphersonii</i> Todzia	Vara blanca	LE.	1

ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN AGROPAISAJES DEL CARIBE COLOMBIANO:
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL

Zuluaga, Z., Caballero, L., Arias, R., Lombo, O., Rivera, R.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
urticaceae	<i>Pourouma cecropiifolia</i> Mart.	Uva de monte, Uva caimarona, caimarón, uva de árbol, uvilla, cucura, camuirro, mapati, tanaribe, puruma y purrum	AF.	1
urticaceae	<i>Urera caracasana</i> (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.	Pringamosa arborea	ME.	1
Arecaceae	<i>Cryosophila kalbreyeri</i> (Dammer ex Burret) Dahlgren	Palmicha, Barbasco de Ramos, palma de escoba	AR.	1
Ulmaceae	<i>Phyllostylon rhamnoides</i> (J.Poiss.) Taub.	Corra, varo blanco	CO.	1
Fabaceae	<i>Pithecellobium unguis-cati</i>	Coralito	FO.	1
Moraceae	<i>Brosimum guianense</i> Huber ex Ducke	Fruta de pava	AF.	1
Polygonaceae	<i>Coccoloba lehmannii</i> de Lindau	Guaraguao, papaturro	OR.	1
Polygonaceae	<i>Coccoloba obovata</i> Kunth	Juan garrote, bagre, buche gallina	AH. ME, RL.	1
Polygonaceae	<i>Coccoloba</i> sp.	Mangle, mangle blanco	LE.	1
Malvaceae	<i>Ochroma piramidale</i> (Cav. ex Lam.)	Balsa, lana, balso	UD.	1
Moraceae	<i>Ficus insípida</i> Willd.	Higuerón	CO.	1
Moraceae	<i>Ficus pallida</i> Vahl	Cope, Pivdjay	AF.	1
Moraceae	<i>Ficus trigonata</i> L.	Caucho, laurel	UD.	1
Moraceae	<i>Ficus ypsilophlebia</i> Dugand	Cope, abrazapalo	ME.	1

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Annonaceae	<i>Xylopia aromática</i> Baill. <i>Sinonimo Xylopia nitida</i> <i>Dunal</i>	Fruto de burro, sembe, malagueto hembra, azota- caballo	ME.	1
Fabaceae	<i>Enterolobium</i> sp.	Chicho	AF.	1
Rubiaceae	<i>Pittoniotis trichantha</i> Griseb.	Marerito, marerito blanco	AH.	1
Bignoniaceae	<i>Handroanthus coralibe</i> (Standl.) S.O.Grose	Coralibe	CA.	1
Lecythidaceae	<i>Gustavia grandibracteata</i> <i>croata y samori</i>	Huevoemorroco	ME.	1
Rubiaceae	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	Cruceto, mariangola, cru- ceta negra, pilon, tachue- lo, mariangola de espina	AF.	1
Rubiaceae	<i>Randia dioica</i> H.Karst.	Cruceto, mariangola	FO.	1
Rubiaceae	<i>Randia formosa</i> (Jacq.) K.Schum. Sinónimo de <i>Rosenbergiodendron</i> <i>formosum</i> (Jacq.) Fagerl.	Maria angola	AF.	1
Annonaceae	<i>Oxandra panamensis</i> R.E.Fr.	Anon	AH.	1
Capparaceae	<i>Capparis pulcherrima</i> Jacq. <i>Sinonimo de Morisonia</i> <i>pulcherrima</i> (Jacq.) Christenh. & Byng	Tutumazo	PS.	1
Fabaceae	<i>Platymiscium pinnatum</i> var. <i>pinnatum</i>	Campanero	FO.	1
Meliaceae	<i>Trichilia martiana</i> C.DC.	Vara de piedra, cedrillo	AF.	1
Myrcinaceae	<i>Stylogyne turbacensis</i> (Kunth) Mez	Patoca de paloma	AF.	1

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	USOS ⁽¹⁾ / NÚMERO DE USOS	
Nyctaginaceae	<i>Neea nigricans</i> Fawc. y Rendle	Buche sapo, esponjoso, sapo	AF.	1
Rubiaceae	<i>Randia gaumeri</i> Greenm. & CHHomps.	Kachuit	FO.	1
Rubiaceae	<i>Rondeletia purdiei</i> Hook. F	Arroz con coco, bola de titi	AF.	1
Salicaceae	<i>Casearia praecox</i> Griseb.	Sapo	ME.	1
Fabaceae	<i>Myrospermum frutescens</i> Jacq.	Mano de pilon, bálsamo	LE.	1
Fabaceae	<i>Geoffroea spinosa</i> (Molina) De Moussay. Sinónimo de <i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Silbadero, puy	LE.	1
Bixaceae	<i>Cochlospermum orinocense</i> (Kunth) Steud.	Bototo, flechero, po-ro-poro	LE.	1

⁽¹⁾ **Construcción.** (CO), leña (LE), carbón (CA), postes muertos (PM), ebanistería (EB), alimento humano (AH), forraje (FO), alimento para la fauna (AF), sombrío (SO), cerca viva (CV), protector de agua (PA), protector de suelo (PS), medicinal (ME), ornamental (OR), artesanía (AR), resina o látex (RL), símbolo cultural (SC), uso doméstico en el hogar (UD).

Fuente: Autores.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.



Licencia de Creative Commons

Revista de Investigación Agraria y Ambiental is licensed under a Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional License.